Cinamite®

FORTIFICANTE - BARRERA FÍSICA FRENTE A PLAGAS DE ÁCAROS Y ERIÓFIDOS

FUERTE CON LOS ÁCAROS Y ERIÓFIDOS, COMPATIBLE CON LOS AUXILIARES

Producto SIN Residuos

Insumo reconocido para agricultura ecológica – agrocolor

COMPOSICIÓN (% P/P):
Mezcla de extractos vegetales (citronella, canela y menta): 13%
Adyuvantes naturales autorizados: 87%
pH: 6,8 a 7,5
Líquido en microemulsión (MW)

AGRICULTURA ECOLÓGICA:
Insumo reconocido por Agrocolor para su empleo en Agricultura Ecológica

O.M.D.F.:
Notificado al Registro Oficial de P. y M. Fitosanitario según Orden APA/1470/2007, de 29 de mayo de 2007

GERDISA AGRO

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN

Cuando **Cinamite®** se pulveriza sobre la superficie foliar, produce una barrera protectora biodegradable que modifica drásticamente su estructura y propiedades físicas, produciendo un efecto desorientador y disuasorio, que altera y dificulta el establecimiento y desarrollo de plagas de ácaros y algunos insectos. En mezcla con acaricidas e insecticidas, posee acción complementaria para reforzar su eficacia en la prevención y control de ácaros, eriófidos y otros insectos.

CULTIVOS Y APLICACIONES RECOMENDADAS

Cinamite® está indicado para su empleo por vía foliar en plantaciones agrícolas y forestales, y viveros de todo tipo, y en el ámbito profesional de parques y jardines. Entre otros, tiene utilidad en los siguientes cultivos: Cítricos, Vid y Parral, Frutales de hoja caduca (de hueso, de pepita,...) y tropicales (aguacatero, mango, chirimoyo, caqui, platanera, etc.), fresales, frambuesos y bayas y pequeños frutos y cultivos hortícolas tanto al aire libre como en invernadero (tomate, pimiento, cucurbitáceas, ajo, lechugas, judía verde, etc.), plantaciones ornamentales y flor cortada (claveles, rosales, etc.), en parques y jardines, cultivos industriales (lúpulo, adormidera, maíz, algodonero, etc.), como mejorante y fortificante de las plantas frente a agresiones causadas por plagas de ácaros *(P. citri, T. urticae* y otros tetraníquidos; *P. latens*, etc.) y eriófidos (*A. lycopersici, Vasates sp.* etc.) y algunos insectos (ninfas de pulgones, moscas blancas y trips).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal foliar de medio y alto volumen, con un gasto de caldo suficiente para realizar una buena cobertura de toda la planta. Emplear de 150 a 250 ml/100 L de agua (min. 1,5 L/Ha). Procurar aplicar en las horas de menor insolación, preferentemente al atardecer, evitando las horas centrales del día y las altas temperaturas.
En caso de ataques ya establecidos, con altas poblaciones, repetir la aplicación a los 5 - 7 días.

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

Cinamite® puede ser incluido en programas de Manejo Integrado de plagas, en cualquier sistema productivo y de certificación de la calidad (GlobalGap, P. Integrada, P. Controlada, A. Ecológica, etc.), y en agricultura convencional. Es una buena herramienta para incorporar a programas de manejo de resistencias a acaricidas e insecticidas.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS

Cinamite® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos habituales. En vegetación, no mezclar con productos que contengan aceites y cobres elementales. Puede mezclarse con azufres mojables de alta calidad, evitando las horas de mayor insolación y elevadas temperaturas.
Es muy compatible y eficaz en mezcla con insecticidas del tipo spinosinas, avermectinas, ketoenoles y otros acaricidas e insecticidas de uso común, incluidos los biológicos.

COMPATIBILIDAD CON LA FAUNA AUXILIAR

Cinamite® es compatible con la mayoría de insectos parasitoides y artrópodos e insectos depredadores (incluido *A. swirskii*), si bien, se recomienda que las sueltas se realicen pasadas al menos 24 después de realizada la pulverización con **Cinamite®**. Se recomienda mantener las colmenas de abejas y abejorros cerradas durante 12-24 H para evitar el contacto directo de los polinizadores con el producto fresco.

PLAZO DE SEGURIDAD Y DE REENTRADA

Los componentes de **Cinamite®** son naturales, biodegradables y exentos de LMR´s; por lo que no proceden estos plazos.
Recomendamos esperar a que la pulverización se haya secado antes de permitir la entrada de trabajadores y transeúntes a las zonas tratadas.

Presentación: 1 L y 5 Litros.

GERDISA AGRO
Distribuidor para CLM
www.gerdisa.com
ventas@gerdisa.com
Tels: 00 34 949 26 00 62 /
00 34 689 682 287

Blue Heron
Plant BioDynamics
info@blueheron.es
www.blueheron.es